



World PI Week
Test. Diagnose. Treat.

در افرادی که با فقدان یا اختلال عملکرد در سیستم ایمنی به دنیا می آیند، بیماری های نقص ایمنی اولیه بروز می کنند. تظاهر اختلالات نقص ایمنی اغلب به صورت عفونت های معمول است. همین مساله بعضی اوقات منجر میشود که پزشکان به درمان معمول آن عفونت اقدام کنند و نقص ایمنی به عنوان زمینه اصلی ایجاد این عفونت ها از چشم دورماند. در این شرایط بیمار به طور مکرر دچار بیماری های عفونی شده و در معرض آسیب به اعضای حیاتی بدن، ناتوانی های جسمی و حتی مرگ قرار می گیرد.

۲۲-۲۹ آوریل



حدود ۳۰۰ نوع بیماری نقص ایمنی اولیه وجود دارد.



۷۰-۹۰٪

از افراد مبتلا به نقص ایمنی اولیه هنوز تشخیص داده نشده اند.



۱:۱۲۰۰

تخمین زده میشود از هر ۱۲۰۰ نفر، یک نفر به نقص ایمنی اولیه (ژنتیکی) مبتلا باشد که سلامت را به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد.


۶ میلیون نفر از مردم در سراسر جهان احتمالاً با نقص ایمنی اولیه زندگی می کنند.



هفته جهانی نقص ایمنی اولیه همه ساله در تاریخ ۲۲-۲۹ آوریل در قالب رویدادهای متعددی در سراسر جهان برگزار می گردد.




بیش از ۵۰ سازمان مردمی مرتبط با نقص ایمنی اولیه در سراسر جهان تاسیس شده اند.



۱۰ علامت هشداردهنده

تشخیص درست یک بیماری نقص ایمنی اولیه با آگاهی از ۱۰ مورد علائم هشداردهنده آغاز می گردد که در حال حاضر به ۴۵ زبان (از جمله فارسی) ترجمه شده است.



روند امضای طومار (petition) هفته جهانی نقص ایمنی از سال ۲۰۱۱ تا کنون



هفته جهانی نقص ایمنی فرصتی است که بیماران، والدین و مراقبت کنندگان از آنها، متخصصان و سیاستگذاران سلامت را در جهت ارتقای آگاهی در ارتباط با نقص ایمنی اولیه گرد هم می آورد.

با مراجعه به سایت زیر به امضا کنندگان "فراخوان اقدام جهت نقص ایمنی اولیه بپیوندید.
(call to action)

www.worldpiweek.org